

# โรคพิษสุนัขบ้า



## อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

### อาการที่พบในคนหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคัน รุนแรงบริเวณที่ถูกกัด



กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ



แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมสติ และเสียชีวิต

### อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

#### ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม



#### ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง



#### ระยะที่ ๓

มีอาการทางตก น้ำลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



### ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา



รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน



### คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

๑. คุณก่าเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป
๒. ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ
๓. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ อปท. ทั่วประเทศ





# โรคพิษสุนัขบ้า



## กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

## การติดต่อของโรค

### ถูกสัตว์มีเชื้อ

กัด

ข่วน

เลียบาดแผล



## อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

### ระยะแรก

### ระยะตื่นเต้น

### ระยะอัมพาต

- บั้สัยเปลั้ยน ไม้ร่าเรั้ง
- หงุดหงั้ด เก้บตั้ว
- หวาดระแวง บ่านต่ายย่าย

- กระวนกระว่าย
- กั้ดไม้เลั้อก
- เห่าหอน

- ไม้ล่ายไหล
- คางห้อยตัก
- ลั้มลง ต่าย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค


**ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%**

## การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลาย ๆ ครั้ง



กั้กหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



ใส่ยา เบตาดีน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง มาตามนัดทุกครั้ง

## \*\*\*คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง\*\*\*



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

### ๑. อย่าเหยย

### ๒. อย่าเหยียบ

### ๓. อย่าแยก

### ๔. อย่าหยิบ

### ๕. อย่ายุ่ง

คาถา  
๕ย  
กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หัว ตัว ขา  
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

เปลา



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก  
หรือไม่มีเจ้าของ

